自贸港的年轻人


薛耀位察看生态除虫情况。


泰国红宝石柚

儋州新农人薛耀位返乡创业：

花6年养土地 种的水果成市场“香饽饽”

盛夏的儋州市雅星镇，太阳把红岭农场的泥土晒得滚烫。6月的风拂过108亩果园，绿橙、贵妃芒压弯枝头，最惹眼的还是那些套着袋的泰国红宝石柚——去年500棵树只结500个商品果，今年刚挂到3000个，还没熟就被预订了大半，市场零售价168元两个，依旧供不应求。

蹲在地头抓起一把黑土的男人叫薛耀位，黝黑的皮肤、沾泥的运动鞋，是位实打实的大学生新农人。十年前，他曾在城市有一份体面工作，如今却在红岭农场扎了根，用近六年时间，摸索出一条“蚯蚓+微生物+草养土”的生态种植路。

南国都市报记者 梁振文 文/图

放下身段褪去书生气　才能接得住地气

“当初说要回来种地，我爸气得半个月没跟我说话。”说起返乡创业的起点，1987年出生，今年已经39岁的薛耀位笑得很坦然。2017年，他不顾亲友“读那么多书回来务农亏大了”的议论，执意回到生他养他的红岭农场。

作为非农业专业出身的大学生，他比谁都清楚跨行的难度：“最大的门槛不是技术，是面子。”他说，“你得先忘了自己是大学生，先学会跟泥土打交道。”家人嘴上反对，行动上却悄悄帮他搭棚、浇水。直到现在，父亲老薛还是会念叨“草都盖过果树了，快去上班吧”，但转头又帮他把陷在坡地的割草机推上来。这份支持，成了他坚持下去的最初动力。

用“笨办法”把土地养肥

薛耀位的果园里，除草剂是绝对“禁品”。草长高了，用割草机割碎了撒进地里，拌上微生物发酵还田；土壤板结了，就靠蚯蚓在地下打“养分通道”。这套“蚯蚓+微生物+草养土”的模式，他足足摸索了六年。

最难的不是担心绝收，而是“熬”。“别人打药三天草就没了，我靠生态办法，半年才把地养肥。”作为大学生，他没有蛮干，而是用新思维解决老问题。发现土地不平、石块太多会卡割草机，他干脆在种树前先把地整平、清走杂物。“就像做人一样，把没用的杂念清除，方向就清楚了。”

如今，这片被他滋养土地，结出的红宝石柚糖度稳定在12至13度，果肉软糯无渣，复购率超过60%，客户从海南一路排到北上广。

试错三年 只为找对路子

泰国红宝石柚曾是泰国皇家专属品种，对气候极其挑剔，在广西等地推广时失败率很高。薛耀位敢押注，靠的不是运气，而是一次次试错后的理性判断。

“在种这个品种前，我试过芒果、橙子、莲雾，都没成。”他说，自己不是专家，只是肯花时间调研。红岭农场白天最高温能冲到42℃，加上特有的南风，最利于糖分沉淀。“别的地方种不出这种口感，就像红岭的石榴，换了地方就不甜。”

为了摸透这个“娇气”的品种，他蹲在果园里记了三年生长笔记。如今，他一眼就能看出柚子树的健康状况。正是这份敬畏自然、尊重科学的坚持，让他把别人眼里的高风险，变成了自己手中的“硬招牌”。

自己没做明白　绝不带老乡种

虽然红宝石柚子市场反响不错，可周边村民要想跟着种，都被他劝住了：“现在产量还不稳定，我得先把技术摸透。”

作为返乡大学生，他对“新农人+农户”的模式有着清醒的坚持：不盲目跟风、不做甩手掌柜、不急着扩面积。“等我亲力亲为管出10—20亩高品质柚子，让老乡看到实实在在的收益，再带着大家一起干。”

夕阳落在红岭农场的山头上，满山的柚子袋随风晃动。这个曾经被质疑“读书读傻了”的大学生，正用一颗颗甜到心尖的红宝石柚，给家乡贴上一张新名片——生态、健康、可持续。“这漫山遍野的绿色，是我写给红岭的情书。”在他看来，把每一颗果子种好，就是对这片红岭沃土最好的回报。

城事播报


七彩花生。

扫码看视频

黑皮冬瓜和七彩花生轮作

昌江大安村村民腰包更鼓了

南国都市报6月16日讯（记者 易帆/文 郑光平/图）6月15日，海南省昌江黎族自治县海尾镇大安村的田埂上，一场别开生面的“田间课堂”正在上演。由中国热带农业科学院分析测试中心联合昌江黎族自治县现代农业发展服务中心主办的“昌江黑皮冬瓜–七彩花生轮作土壤地力提升关键技术”示范观摩会，吸引了几十名农技专家、种植大户现场观摩学习。

“看，这片花生地长势多好，亩产商品果能有700余斤呢！”站在田埂边上，农户胡家福俯身拨开翠绿的花生苗，露出密密麻麻、饱满的荚果，脸上洋溢着丰收的喜悦。他掰着手指头给记者算账：“以前我们村一年里卖完冬瓜就闲了，没收入。现在种了七彩花生，六月就能多收一季，一年有两季收入了！今年第一茬种了100余亩，一斤能卖9块5。”

“收购商直接来地里收，我这花生饱满度有90%，别的地方种的可比不了。”胡家福拍了拍沾满泥土的手，笑呵呵地说，“这技术，棒！”

胡家福的底气，来自脚下这片土地的“蜕变”。大安村是昌江黑皮冬瓜的“一村一品”核心产区，凭借耐储运、产量高、错峰上市等优势，冬瓜成了村民的“致富瓜”。但连年种植带来的连作障碍日益严重：镰刀菌等病原菌积累导致枯萎病、黄叶病频发；过度消耗钾、钙元素引发冬瓜“黑心”病害；土壤酸化板结，根系发育受阻。而每年2月至9月的高温多雨季节，除少量水稻外，大量农田处于闲田状态，土地利用率极低。

据介绍，大安村通过多年种植模式探索，在热科院分析测试中心的帮扶下，构建了冬季瓜菜和花生的轮作体系。“我们利用花生固氮培肥和改良土壤的技术，实现了地力提升、农民增收、农业增效的目标。”昌江黎族自治县现代农业发展服务中心土肥室负责人黄汉驹表示，下一步，昌江将继续与热科院体系深化合作，遵循“产量稳、品质优、效益好”的原则，大力推进产业转型升级。